

AVERTIZAREA NR. 83 / 16.11.2023

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare -

TRATAMENT DE IARNA . - POMI FRUCTIFERI

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare se recomandă utilizarea următoarelor produse de protecția plantelor omologate.

DAUNATORI

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant (tratament de iarna	14 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant (tratament de iarna	14 zile	-

JUVINAL 10 EC

plantatii de mar	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,1% (larve hibernante in per. de iarna)	-	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,1% (larve hibernante in per. de iarna)	-	-

ESTIUOIL/(YAGOS-a doua denumire comerciala)

Cais	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Cires	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
gutui	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Nectarin	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Par	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Piersic	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-

OVI PRON TOP/(VERNOIL - a doua denumire comerciala)

ais	• Dăunători	Paduchele din San Jose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-
Cires	• Dăunători	Paduchele din San Jose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-
Nectarin	• Dăunători	Paduchele din San Jose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-
Piersic	• Dăunători	Paduchele din San Jose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-
Pomi fructiferi (mar, par)	• Dăunători	Paduchele din San Jose, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, puricele melifer al parului, afide, paduchele lanos	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-
Prun	• Dăunători	Paduchele din San Jose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile	-

PLANTOIL

Pomi fructiferi (samburoase)	Dăunători	Quadraspidotus perniciosus (Paduchele din San Jose)	0,75-1,0 % (3,75-15,0 L/ha)	-	-
pomi fructiferi (semin' toase)	Dăunători	Quadraspidotus perniciosus (Paduchele din San Jose)	0,75-1,0 % (3,75-15,0 L/ha)	-	-

BOLI

ALCUPRAL 50 PU

gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	4,5 kg/ha (0,3%) Se aplica prefloral	-	-
gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa	-	-
Mar	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului)	1,5-2,0 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	2,0 kg/ha (0,2%) Se aplica prefloral;	-	-
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa	-	-
Par	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului); Erwinia amylovora (Focul bacterian)	3,0 kg/ha (0,3%) in 1000 L apa	-	-
Prun	Boli	Polistigma rubrum (Patarea rosie a frunzelor de prun); Monilinia sp. (Monilioza)	2,0 kg/ha (0,2%)	-	-
Prun	Boli	Stigmina carpophila (Ciuruirea frunzelor)	1,5-2,0 kg/ha	-	-

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Cais	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Cais	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
Cires	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
Mar	Boli	Rapan, focul bacterian	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica prefloral	-	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-
Prun	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
Visin	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-

BOUILLIE BORDELAISE WDG

gutui	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	7,5 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Venturia inaequalis (rapanul marului)	0,5% (7,5 kg/ha)	-	-
Mar	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	7,5 kg/ha	-	-
Par	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	7,5 kg/ha	-	-
Par	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	7,5 kg/ha	-	-
Piersic	Boli	Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (moniliza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
Prun	Boli	Polystima rubrum (patarea rosie a frunzelor de prun), Stigmia carpophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
Cires	Boli	Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
Visin	Boli	Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-

ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala)

gutui	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Venturia spp (rapan)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Erwinia spp. (focul bacterian)	7,5 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Mosmon	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Par	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-

Tratamentul se va executa dupa caderea a cel putin 90 % din frunze. Al doilea tratament se va repeta cel mai devreme dupa 30 de zile de la primul si se poate prelungi pana cand 1-5 % din mugurii floralii sunt la faza de umflare. Ambele tratamente se executa numai in zilele in care temperatura atmosferica este mai mare de $+4^{\circ}\text{C}$; $+5^{\circ}\text{C}$.

-Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii ,mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).